



# Bilan Mensuel de l'Activité Volcanique de la Soufrière de Guadeloupe et de la Sismicité Régionale

No. 2004-05 – mai 2004



ISSN 1622-4523

page 1 sur 2

## A - Activité Volcanique de la Soufrière de Guadeloupe

La Soufrière de Guadeloupe est un volcan actif de type explosif ayant connu de nombreuses éruptions magmatiques et phréatiques par le passé. Son activité sismique, fumerollienne et thermique est globalement en lente augmentation depuis 1992. Si cette activité incite l'observatoire à la vigilance instrumentale, elle n'est cependant pas associée à une anomalie des paramètres de surveillance liés à une éventuelle remontée de magma (séismes profonds, déformations à grande échelle, gaz soufrés à haute température). Sur base des observations de l'OVSG-IPGP enregistrées au cours du mois de mai 2004 et résumées ci-dessous, aucune activité éruptive n'est à prévoir prochainement.

Cependant, les émanations gazeuses aux abords et sous le vent des fumerolles du Cratère Sud présentent, depuis 1998, des risques avérés d'irritation et de brûlures (yeux, peau, voies respiratoires). Selon l'arrêté municipal N°01-296 de la ville de Saint-Claude, seules les zones du sommet éloignées des fumerolles acides et nocives sont accessibles au public. Des barrières mises en place par le Parc National délimitent en partie cette zone interdite.

**Sismicité volcanique** : au cours du mois, l'observatoire a enregistré **39** séismes superficiels localisés sous le dôme de la Soufrière et de faible énergie (magnitude maximale **0.7**, énergie cumulée **0.11 MJ**). Cette sismicité s'est traduite essentiellement sous forme d'essaim de tous petits séismes entre les **30 et 31 mai 2004**, non ressentis. Aucun séisme profond n'a été détecté. Cette sismicité superficielle et de faible énergie, observée depuis 1992, est probablement liée à l'activité du système hydrothermal de la Soufrière (circulations et interactions de gaz, vapeur et eau sous pression dans la roche poreuse et fracturée).

**Activité fumerollienne** : en baisse significative en fin de mois probablement en raison des pluies importantes. Les débits restent cependant élevés au Cratère Sud, avec des températures de gaz stables (**94.7 °C** maximum), une acidité présente mais un peu moins marquée (pH entre **1.9** et **2.8**) et quelques dépôts de soufre solide. Persistance de gouttelettes d'acide chlorhydrique mélangées à des gaz volcaniques (**H<sub>2</sub>S**, **HCl**, **SO<sub>2</sub>**) en concentration non négligeable dans un rayon de 50 m environ et sous le vent des fumerolles. Après plusieurs mois d'assèchement, la vasque d'acide est à nouveau remplie (pH très acide de **0.2**). Un prélèvement a été effectué le 4 mai 2004 au fond du gouffre Tarissan (température **97 °C** et pH **0.6**). Les gouffres de la fracture Napoléon présentent un dégagement gazeux moyen et sans pression.

**Sources thermales** : pas d'échantillonnage réalisé au cours du mois. Les résultats de début juin seront présentés dans le prochain bulletin.

**Forages** : les températures de fonds de forages sont stables : Col de l'Échelle (-76 m) **23.2 °C** (en baisse régulière depuis 1977), Savane à Mulets (-96 m) **30.0 °C**.

**Déformations** : pas de déformations significatives de l'édifice en inclinométrie (Breislack, Fente du Nord, Rivière Noire, Rivière du Galion, Cave de Tarade), GPS continu (sommet Piton Sanner), distancemétrie laser (dôme).

**Phénoménologie** : Les émanations acides et le vent maintiennent le dépérissement de la végétation sur la partie Sud du sommet et sur les flancs Sud-Ouest et Ouest du volcan.

**Météorologie au sommet** : au cours du mois, pluviosité cumulée de **1055 mm**, ensoleillement moyen de **114 W/m<sup>2</sup>**, vents de vitesse moyenne **43 km/h** (maximum **75 km/h**) et de direction moyenne **Est-Sud-Est**.

## B – Activité Tellurique Régionale

L'arc insulaire des Petites Antilles résulte du plongement de la plaque Atlantique sous la plaque Caraïbe. C'est une subduction active avec une vitesse de rapprochement de 2 cm/an, faisant de notre archipel une région à forts aléas volcanique et sismique. Certains séismes sont directement liés au processus de subduction et sont en général profonds. D'autres plus superficiels et souvent moins forts résultent de la déformation de la plaque Caraïbe. Durant la période historique, plusieurs séismes ont causé des dégâts en Guadeloupe (les plus forts en 1735, 1810, 1843, 1851 et 1897).

Actuellement, l'Observatoire enregistre une moyenne de 60 séismes par mois dont certains peuvent être ressentis. Les séismes ne sont pas prévisibles et peuvent survenir à n'importe quel moment.

**Sismicité régionale** : l'Observatoire a enregistré au cours du mois, dans un rayon de 450 km autour de la Guadeloupe, un total de 51 séismes d'origine tectonique de magnitude maximale 4.1. Aucun de ces séismes n'a été signalé ressenti par la population guadeloupéenne.

**Volcanisme Montserrat** : L'activité du volcan Soufriere Hills est assez faible et dominée par des séismes d'amplitudes et de durées variables. Les pluies importantes ont engendré une série de coulées de boue dans la vallée de Belham les 21 et 22 mai 2004. Le dégazage de soufre est faible à moyen avec un maximum de 922 t/j de SO<sub>2</sub>. Cette activité peut changer rapidement ; le volcan et la zone dévastée restent exposés à des phénomènes volcaniques particulièrement dangereux (explosions, nuées ardentes, coulées de boue). L'accès au volcan (tout le Sud de l'île en dessous de Garibaldi Hill et Belham Bridge Gate) est toujours interdit, et la zone d'exclusion marine de 2 miles nautiques est conservée. Pour plus d'information, reportez-vous au site Internet du MVO <http://www.mvo.ms/>.

**Volcanisme Dominique** : Informations sur le site <http://www.uwiseismic.com>.

Le 11 juin 2004

Dr François Beauducel

Directeur et Responsable Scientifique

**Annexe** : Correspondances entre activité volcanique et délais possibles avant éruption

<b>Activité globale observée</b>	<b>Minimale</b> niveau de base	<b>En augmentation</b> variations de quelques paramètres	<b>Fortement augmentée</b> variations de nombreux paramètres, sismicité fréquemment ressentie	<b>Maximale</b> sismicité volcanique intense, déformations majeures, explosions
<b>Délais possibles</b>	Siècle(s) / Années	Année(s) / Mois	Mois / Semaines	Imminente / En cours

**Merci aux organismes, collectivité et associations d'afficher publiquement ce bilan pour une diffusion la plus large possible.**

**Les informations de ce document ne peuvent être utilisées sans y faire explicitement référence.**