

Bilan Mensuel de l'Activité Volcanique de la Soufrière de Guadeloupe et de la Sismicité Régionale

No. 2005-08 - août 2005



ISSN 1622-4523

page 1 sur 6

A - Activité Volcanique de la Soufrière de Guadeloupe

La Soufrière de Guadeloupe est un volcan actif de type explosif ayant connu de nombreuses éruptions magmatiques et phréatiques par le passé. Depuis 1992, son activité sismique, fumerollienne et thermique est globalement en lente augmentation ce qui traduit une augmentation de l'activité du système hydrothermal (circulations et interactions de gaz, vapeur et eau sous pression dans la roche poreuse et fracturée). Si ces phénomènes incitent l'observatoire à la vigilance instrumentale, ils ne sont cependant pas associés à une anomalie des autres paramètres de surveillance liés à une éventuelle remontée de magma (séismes profonds, déformations à grande échelle, gaz soufrés à haute température).

Sur base des observations de l'OVSG-IPGP enregistrées au cours du mois d'août 2005 et résumées ci-dessous, aucune activité éruptive n'est donc à prévoir prochainement.

Cependant, les émanations gazeuses aux abords et sous le vent des fumerolles du Cratère Sud présentent, depuis 1998, des risques avérés d'irritation et de brûlures (yeux, peau, voies respiratoires). Selon l'arrêté municipal N°01-296 de la ville de Saint-Claude, seules les zones du sommet éloignées des fumerolles acides et nocives sont accessibles au public. Des barrières mises en place par le Parc National délimitent en partie cette zone interdite.

Sismicité volcanique : au cours du mois, l'observatoire a enregistré **39** séismes d'origine volcanique, de très faible énergie (0.5 MJ au total), de magnitude maximale **1.1** et tous localisés sous le massif de la Soufrière à moins de 1 km sous le niveau de la mer. Ces séismes se sont produits essentiellement sous forme d'un essaim entre les 6 et 9 août 2005. Aucun séisme profond n'a été détecté. Aucun séisme n'est susceptible d'avoir été ressenti.

Activité fumerollienne : élevée avec de forts débits au Cratère Sud, des températures de gaz stables (**103.6 °C** max), une acidité très marquée (pH **0.94**) et une quantité importante de soufre solide. Persistance de gouttelettes d'acide chlorhydrique mélangées aux gaz volcaniques (**H₂S**, **HCl**, **SO₂**) en concentration non négligeable dans un rayon de 50 m environ et sous le vent des fumerolles. Maintien de l'activité moyenne sur les autres zones actives (gouffre Tarissan et fracture Napoléon).

Sources thermales : certaines sources proches du volcan maintiennent une très faible et lente augmentation de température alors que d'autres sont stables ou en baisse (mesures du **3 au 5 août 2005**) : Eaux Vives **47.8 °C**, Galion **45.9 °C**, 2^{ème} Chute du Carbet **45.2 °C**, Tarade **40.3 °C**, Pas du Roy **34.0 °C**, Bains Jaunes **31.0 °C**, Carbet-Échelle **21.6 °C**). Les propriétés physico-chimiques restent normales (acidité, conductivité électrique, concentrations ioniques).

Forages : les températures de fonds de forages sont stables : Col de l'Échelle (-76 m) **22.4 °C** (poursuit sa baisse régulière mais de plus en plus atténuée depuis 1977), Savane à Mulets (-96 m) **30.3 °C**.

Déformations : pas de déformations significatives de l'édifice en inclinométrie (Fente du Nord, Rivière Noire, Galion), ni en GPS continu (sommet Piton Sanner).

Phénoménologie : Les émanations acides et le vent maintiennent le dépérissement de la végétation sur la partie Sud du sommet et sur les flancs Sud-Ouest et Ouest du volcan. Mis à part les éboulements notés sur le dôme, l'activité globale de la Soufrière n'a pas été perturbée par le séisme du 21 novembre 2004 ou par ses plus fortes répliques.

Météorologie au sommet : station en cours de maintenance.

B - Activité Tellurique Régionale

L'arc insulaire des Petites Antilles résulte du plongement de la plaque Atlantique sous la plaque Caraïbe. C'est une subduction active avec une vitesse de rapprochement de 2 cm/an, faisant de notre archipel une région à forts aléas volcanique et sismique. Certains séismes sont directement liés au processus de subduction et sont en général profonds. D'autres plus superficiels et souvent moins forts résultent de la déformation de la plaque Caraïbe. Durant la période historique, plusieurs séismes ont causé des dégâts et/ou des victimes en Guadeloupe (les plus forts, d'intensités supérieures ou égales à VII, s'étant produits en 1735, 1810, 1843, 1851, 1897 et 2004).

Le séisme des Saintes du 21 novembre 2004, magnitude 6.3, a été suivi de plus de 23 700 séismes identifiés comme répliques, dont l'une très importante le 14 février 2005, de magnitude 5.7. Les répliques dans cette zone des Saintes se poursuivent au moment de la rédaction de ce bilan. Une synthèse des événements produits au mois d'août 2005 est présentée ci-dessous et complète les bulletins précédents.

Les séismes ne sont pas prévisibles et peuvent survenir à n'importe quel moment dans l'archipel de la Guadeloupe. Les actions de prévention du risque restent de rigueur : respect des normes parasismiques de construction, aménagement intérieur des lieux de vie, apprentissage du comportement à tenir avant, pendant et après un séisme.

Sismicité régionale : outre les séismes localisés dans la zone des Saintes (voir ci-dessous), l'Observatoire a enregistré au cours du mois, dans un rayon de 450 km autour de la Guadeloupe, un total de **30** séismes d'origine tectonique de magnitude maximale **5.0**. Ce dernier s'est produit le 30 août 2005 à 10h02 locales et a été localisé à environ 40 km à l'est de la Caravelle (Martinique), à 50 km de profondeur (données OVMP). C'est un séisme de subduction qui a été largement ressenti en Martinique (intensité IV) mais aussi en Guadeloupe (intensités entre I et III). Il a fait l'objet d'un communiqué des observatoires de Martinique et de Guadeloupe.

Séismes des Saintes : on compte maintenant près de **23 700** répliques du 21 novembre 2004 au 31 août 2005 inclus (voir figure 1) dans la zone de failles au sud-est des Saintes. Toutes de plus faible magnitude que le choc principal, la plus forte réplique depuis le début de la crise a été le 14 février 2005 à 14h05 (magnitude 5.7).

Au cours du mois d'août 2005, on a enregistré près de **650** répliques dont environ **40** ont été potentiellement ressenties, en grande partie par les habitants des Saintes qui sont parfois très proches des épicentres (voir figure 2). Six communiqués ont été envoyés aux autorités et aux médias, lorsque l'intensité estimée atteignait III à IV dans au moins une commune de Guadeloupe. Les plus importantes des répliques ont été :

- en terme de magnitude : le 21 août à 11h29, magnitude **3.1** localisée à 4 km au sud-sud-est de Terre-de-Bas à 6 km de profondeur, intensités moyennes estimées à **III à IV** (largement ressenti) aux Saintes, II à III à Vieux-Fort et Trois-Rivières, I à II dans les autres communes de Guadeloupe ;
- en terme d'intensité : le 10 août à 09h15, magnitude **2.8** localisée à 2 km au sud-sud-est de Terre-de-Bas à 3 km de profondeur, intensités moyennes estimées à **IV à V** (fortement ressenti) à Terre-de-Bas, III à IV à Terre-de-Haut, II à III à Vieux-Fort et Trois-Rivières, I à II dans les autres communes de Guadeloupe ;




Figure 1. Évolution du nombre de séismes (répliques des Saintes) entre le 21 novembre 2004 et le 31 août 2005 (estimations du nombre de séismes potentiellement ressentis et nombre total par jour).

Les particularités de ce mois d'août 2005 ont été un maintien du nombre de répliques par rapport aux mois précédents (voire une très légère hausse), un plus grand nombre d'événements dans la zone nord et sud de Terre-de-Bas, trois périodes (les 4-6, 10-11 et 26-27) au cours desquelles le taux de répliques a dépassé 40 par jour (ceci ne s'était pas produit depuis le mois de juin 2005), et enfin le 17 août un séisme isolé de magnitude 2.9 survenu entre Vieux-Fort et Trois-Rivières, largement ressenti (III à IV) dans les communes du sud Basse-Terre. Ce dernier est probablement lié aux perturbations de la crise des Saintes, mais n'a été ni précédé ni suivi d'aucun séisme même mineur dans cette zone.




Figure 2. Localisations préliminaires des 114 plus fortes répliques du mois d'août 2005 : taille des symboles = magnitude, couleur = profondeur, étoiles = séisme supposé ressenti, traits noirs = failles connues, traits gris = courbes bathymétriques.

D'après nos connaissances actuelles du système de failles et de son comportement, la situation est normale. Les répliques devraient globalement continuer de s'espacer dans le temps et de s'atténuer, mais se poursuivront encore plusieurs mois avec des séismes pouvant atteindre des magnitudes autour de 4 à 5. La prudence reste donc de rigueur, puisque suivant leurs localisations (et notamment leurs profondeurs), de telles magnitudes seront plus ou moins fortement ressenties par la population et pourront encore potentiellement provoquer des dégâts.

Volcanisme Montserrat : L'activité du volcan Soufriere Hills s'est maintenue à un niveau élevé dominé par des explosions de cendres et des séismes d'amplitudes et de durées variables. Les principales explosions se sont produites le 6 août (panache de cendres atteignant 2000 m d'altitude) et le 18 août 2005. Toutes ces explosions ont entraîné d'importantes retombées de cendres. Plusieurs survols aériens ont montré qu'un dôme étant en lente formation, avec un volume estimé à environ 1.5 million m³. Le dégazage de soufre est faible à moyen avec un maximum de **1160 t/j** de SO₂, alors que la moyenne sur l'ensemble de l'éruption est d'environ 500 t/j Cette activité peut changer rapidement ; le volcan et la zone dévastée restent exposés à des phénomènes volcaniques particulièrement dangereux (explosions, nuées ardentes, coulées de boue). L'accès au volcan, aux zones alentours et aux abords de l'île sont interdits ou soumis à restriction. Pour plus d'information, reportez-vous au site Internet du MVO <http://www.mvo.ms/>.

Volcanisme Dominique : Informations sur le site <http://www.uwiseismic.com>.

*Le 7 août 2005
Dr François Beauducel
Directeur et Responsable Scientifique*

C - Annexes

Définition des niveaux d'activité volcanique pour la Soufrière de Guadeloupe

Activité globale observée	Minimale niveau de base	En augmentation variations de quelques paramètres	Fortement augmentée variations de nombreux paramètres, sismicité fréquemment ressentie	Maximale sismicité volcanique intense, déformations majeures, explosions
Délais possibles	Siècle(s) / Années	Année(s) / Mois	Mois / Semaines	Imminente / En cours
Décision	← OVSG-IPGP →		← Préfecture →	
Niveaux d'alerte	VERT = Pas d'alerte	JAUNE = Vigilance	ORANGE = Pré alerte	ROUGE = Alerte

Définition de l'échelle des intensités sismiques

Intensités	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+
Perception Humaine	Non ressenti	Très faible	Faible	Légère	Modérée	Forte	Très forte	Sévère	Violente	Extrême
Dégâts probables	aucun				Très légers	Légers	Modérés	Moyens	Importants	Généralisés

Appel à témoignages sur les séismes ressentis

Les intensités réelles ne peuvent être correctement déterminées que par recueil de témoignages. Si vous avez ressenti un séisme, même faiblement, vous êtes invité à prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'enquête macrosismique du BCSF sur le site <http://www.seisme.prd.fr/>.

Il y a 30 ans... la Soufrière

Août 1975. Après l'augmentation du mois de juillet, l'activité sismique de la Soufrière revient à un niveau faible. Le Laboratoire de Physique du Globe a enregistré au cours du mois un seul séisme d'origine volcanique. De faible amplitude, ce séisme correspond à une énergie libérée de 0.2 MJ.

Jusqu'en mars 2007, retrouvez tous les mois un récit des principales observations du Laboratoire de Physique du Globe effectuées 30 ans auparavant. Rubrique réalisée avec l'aimable concours de Michel

Merci aux organismes, collectivité et associations d'afficher publiquement ce bilan pour une diffusion la plus large possible. Pour le recevoir par e-mail, faites une demande à info@ovsg.univ-ag.fr

Les informations de ce document ne peuvent être utilisées sans y faire explicitement référence.
