

## A - Activité Volcanique de la Soufrière de Guadeloupe

La Soufrière de Guadeloupe est un volcan actif de type explosif ayant connu de nombreuses éruptions magmatiques et phréatiques par le passé. Depuis 1992, son activité sismique, fumerollienne et thermale poursuit un régime fluctuant mais globalement en lente augmentation, qui se traduit par une forte activité du système hydrothermal (circulations et interactions de gaz, vapeur et eau sous pression dans la roche poreuse et fracturée). Si ces phénomènes incitent l'observatoire à la vigilance instrumentale, ils ne sont cependant pas associés à une anomalie des autres paramètres de surveillance liée à une éventuelle remontée de magma (séismes profonds, déformations à grande échelle, gaz soufrés à haute température).

Sur la base des observations de l'OVSIG-IPGP enregistrées au cours du mois de juin 2013 et résumées dans ce bulletin, aucune activité éruptive n'est à prévoir prochainement, mais le niveau actuel reste

**VIGILANCE (= JAUNE)**

(Voir tableau en annexe).

Cependant, les émanations gazeuses aux abords et sous le vent des fumerolles du Cratère Sud présentent, depuis 1998, des risques avérés d'irritation et de brûlures (yeux, peau, voies respiratoires). En raison de la présence de ces gaz toxiques, l'arrêté municipal N°01-296 de la ville de Saint-Claude interdit l'accès du public à certaines zones du sommet.

### Sismicité volcanique

Au cours du mois de juin, l'observatoire n'a localisé aucun séisme volcanique.

### Activité fumerollienne

Activité toujours élevée avec de forts débits au Cratère Sud (sur les 3 bouches d'émission) et d'importants dépôts de soufre solide. L'acidité sort de sa gamme de valeurs habituelles (pH entre 1 et 2) avec un pH de **3.20**. Les températures restent élevées (**100°C** au Cratère Sud Central).

Persistance de gouttelettes d'acide chlorhydrique mélangées aux gaz volcaniques. Maintien de l'activité moyenne ou faible sur les autres zones actives : gouffre Tarissan, cratère Napoléon, gouffre 1956, fractures Lacroix, route de la Citerne. Un prélèvement du lac acide du gouffre Tarissan a été effectué en mars dernier (**5 mars 2013**), montrant un pH de **-0.47**.

### Sources thermales

Les températures des sources sont pour la plupart stables. C'est le cas pour Galion **46.4 °C** (47.8 °C en mai), Bains Jaunes **29.1 °C** (28.4 °C en mai), Pas du Roy **33.3 °C** (33.9 °C en mai), Tarade **40.7 °C** (38.9 °C en mai). Après plusieurs mois de baisse répétée, la température d'Habitation Revel poursuit sa remontée **32.9 °C** (**32.2 °C** en mai) à un niveau de température comparable à celui d'octobre 2012. Les Bains Chauds du Matouba sont toujours la source la plus chaude : **58.4 °C**.

### Forages

Les dernières températures de fond de forage relevées au Col de l'Echelle (76m de profondeur) étaient inférieures à **20 °C**.

### Déformations

On n'observe pas de déformation du dôme (stations GPS).

### Phénoménologie

Les émanations acides et le vent maintiennent le dépérissement de la végétation sur la partie Sud du sommet et sur les flancs Sud-Ouest et Ouest du volcan.

### Météorologie au sommet

Au cours du mois, on note un ensoleillement moyen plutôt faible de **93 W/m<sup>2</sup>**, des vents de vitesse moyenne **61 km/h** (maximum **108 km/h**) et de direction moyenne **Est**. La pluviométrie cumulée vaut **325 mm**.

## B - Activité Tellurique Régionale

L'arc insulaire des Petites Antilles résulte du plongement de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbe. Cette subduction active a une vitesse de convergence de 2 cm/an. Elle provoque une déformation de la limite de ces plaques, faisant de notre archipel une région à forts aléas volcanique et sismique. Certains séismes sont directement liés aux processus de glissement entre les deux plaques. D'autres, plus superficiels, résultent de la déformation de la plaque Caraïbe. D'autres encore résultent de la rupture de la plaque océanique plongeant sous la Caraïbe. Durant la période historique, plusieurs séismes ont causé des dégâts / victimes en Guadeloupe (intensités supérieures ou égales à VII) : 1735, 1810, 1843, 1851, 1897, 2004 et 2007.

Au cours du mois de juin 2013, l'activité tellurique régionale affiche un nombre de séismes comparable au nombre qui a été observé le mois dernier. Il y a toujours poursuite de l'activité sismique aux Saintes et en Nord Dominique.

Les séismes ne sont pas prévisibles et peuvent survenir à n'importe quel moment dans l'archipel de la Guadeloupe. Les actions de prévention du risque restent de rigueur : respect des réglementations parasismiques en vigueur, aménagement intérieur des lieux de vie, apprentissage du comportement à tenir avant, pendant et après un séisme.

### Sismicité régionale

L'Observatoire a localisé au cours du mois, dans une région de 450 km autour de la Guadeloupe, un total relativement peu élevé de **40** séismes de magnitude comprise entre **0.8 et 4.0** (voir la carte des épïcêtres, Figure 1).

Le plus gros des séismes tectonique, de magnitude **4.0** sur l'échelle de Richter, s'est produit le Lundi 24 juin à **72 km** à l'Est-Sud-Est des îles de la Petite-Terre, et **20 km** de profondeur. Il n'y a pas eu de témoignages reportés sur le site du BCSF, néanmoins il apparaît, d'après des témoignages recueillis dans l'entourage de l'Observatoire que ce séisme aurait été ponctuellement ressenti en Guadeloupe.

En ce qui concerne l'archipel guadeloupéen, la répartition géographique de l'activité sismique est comparable à celle des mois précédents, avec une sismicité superficielle localisée principalement le long

des grands systèmes de failles distribuées entre Marie Galante et Antigua.

**15** séismes de magnitude maximale **3.8** ont été localisés dans la zone de répliques du séisme des Saintes du 21 avril 2004, entre les Saintes et la Dominique. Aucun séisme n'a été ressenti aux Saintes (pas de témoignage). Les séismes de ce mois dans la zone des Saintes sont répartis de façon assez homogène : ils sont en réalité éloignés des Saintes et plutôt concentrés sur les failles situées directement au Nord-Nord-Ouest de la Dominique.




Figure 1. Carte des épïcêtres du mois de juin 2013 correspondant aux séismes enregistrés et localisés par l'OVSG-IPGP dans un rayon de 450 km autour de la Guadeloupe. Traits noirs = failles principales connues (d'après Feuillet et al. 2000).

### Volcanisme Montserrat

Durant le mois de juin, l'activité de Soufriere Hills a été faible. Dix-sept instabilités gravitaires mineures ont été enregistrées par les sismographes. L'activité sismique volcanique n'est pas excessive avec un bilan mensuel d'une vingtaine de séismes volcano-tectoniques et un séisme volcanique longue période. Le flux de dioxyde de Soufre se situe à son niveau habituel (moyennes hebdomadaires qui varient cette fois-ci entre 289 et 485 tonnes/jour). Des écoulements pyroclastiques peuvent survenir à tout moment et sans avertissement sur n'importe quelle face du volcan. Cela comprend la ville de Gages à partir duquel les écoulements peuvent atteindre rapidement Plymouth. Le risque de crues subites et de lahars rend la traversée de la vallée de la Belham dangereuse pendant et après les chûtes de pluie. L'accès au

volcan, aux zones alentours et aux abords de l'île sont interdits ou soumis à restriction.

Pour plus d'information, reportez-vous au site du MVO:  
<http://www.mvo.ms/>

*La Direction de l'OVSG-IPGP le 29 juillet 2013*

## C - Annexes

### Définition des niveaux d'activité volcanique pour la Soufrière de Guadeloupe

<b>Activité globale observée</b>	<b>Minimale</b> niveau de base	<b>En augmentation</b> variations de quelques paramètres	<b>Fortement augmentée</b> variations de nombreux paramètres, sismicité fréquemment ressentie	<b>Maximale</b> sismicité volcanique intense, déformations majeures, explosions
<b>Délais possibles</b>	Siècle(s) / Années	Année(s) / Mois	Mois / Semaines	Imminente / En cours
<b>Décision</b>	← OVSG-IPGP →		← Préfecture →	
<b>Niveaux d'alerte</b>	<b>VERT = Pas d'alerte</b>	<b>JAUNE = Vigilance</b>	<b>ORANGE = Pré alerte</b>	<b>ROUGE = Alerte</b>

### Définition simplifiée de l'échelle des intensités macrosismiques

Intensités	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+
<b>Perception Humaine</b>	Non ressenti	Très faible	Faible	Légère	Modérée	Forte	Très forte	Sévère	Violente	Extrême
<b>Dégâts probables</b>	aucun				Très légers	Légers	Modérés	Moyens	Importants	Généralisés

### Appel à témoignages sur les séismes ressentis

Les intensités réelles (effets d'un séisme en un lieu donné) ne peuvent être correctement déterminées que par recueil de témoignages. Si vous avez ressenti un séisme, même faiblement, vous êtes invité à le signaler à l'observatoire et/ou à prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'enquête macrosismique du BCSF sur le site <http://www.franceseisme.fr/>.

---

**Merci aux organismes, collectivités et associations d'afficher publiquement ce bilan pour une diffusion la plus large possible. Pour le recevoir par e-mail, faites simplement la demande à <[infos@ovsg.univ-ag.fr](mailto:infos@ovsg.univ-ag.fr)>. Les précédents bulletins et communiqués (depuis 1999) sont en ligne sur le site [www.ipgp.jussieu.fr/](http://www.ipgp.jussieu.fr/), rubrique Observatoires Volcanologiques, Guadeloupe, Actualités.**

**Les informations de ce document ne peuvent être utilisées sans y faire explicitement référence.**

---