

# Bilan trimestriel de l'activité volcanique de la Montagne Pelée et de la sismicité régionale de la Martinique

No. 2016-2 – Avril, mai et juin 2016



Observatoire volcanologique  
et sismologique  
de Martinique  
INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS



Collectivité  
Territoriale  
de Martinique

ISSN 2105-  
2301

page 1 sur 3

## A - Activité Volcanique de la Montagne Pelée

La Montagne Pelée est un volcan actif de type explosif ayant connu de nombreuses éruptions magmatiques et phréatiques par le passé. Depuis la fin de la dernière éruption magmatique en 1932 (éruption avec mise en place de dôme), son activité a décliné de manière significative.

L'activité fumerolienne est nulle, l'activité hydrothermale poursuit un régime globalement en lente diminution. L'activité sismique est faible et traduit l'activité du système hydrothermal (circulations et interactions de gaz, vapeur et eau sous pression dans la roche poreuse et fracturée). On ne constate pas d'anomalie des autres paramètres de surveillance liée à une éventuelle remontée de magma (séismes profonds, déformations à grande échelle, gaz soufrés à haute température).

Sur la base des observations de l'OVSM-IPGP enregistrées au cours des mois d'avril, mai et juin 2016 et résumées dans ce bulletin, aucune activité éruptive n'est à prévoir prochainement, et le niveau actuel reste

**VERT = PAS D'ALERTE**

(Voir tableau en annexe).

### Sismicité volcanique

Au cours du trimestre, l'observatoire a détecté 1 séisme volcano-tectonique qui n'a pas pu être localisé. D'origine très superficielle (prof. max : 2.1 km) et de faible magnitude ( $1.2 < M < 2.3$ ), ce type de séisme traduit probablement la circulation hydrothermale dans l'édifice.

### Puits Chaud et Sources thermales

Les températures, pH et conductivité des eaux du forage Puits Chaud (6 m de profondeur) sont relativement stables ce trimestre ( $T = 32,1 - 33,2^{\circ}\text{C}$ ,  $\text{pH} = 6,86 - 6,96$  et  $\text{conductivité} = 999 - 1050$  microSiemens/cm). L'échantillonnage des sources chaudes de la Rivière Chaude n'a pas été effectué ce trimestre.

Ces mesures confirment la lente diminution de la température des eaux thermales souterraines de la coulée de la Rivière Blanche depuis le milieu des années 1960 jusqu'à ce jour.

### Actualité diverse : Glissements et lahars

Au cours du second trimestre 2016, 102 glissements d'intensité variable ont été enregistrés (dont 5 sont localisables) sur les flancs de la Montagne Pelée. Les bruits entendus dans les vallées peuvent être dus aux éboulements les plus importants.

Lors des phénomènes pluvieux, les dépôts de ces glissements sont remobilisés et s'évacuent vers la mer. Ce trimestre, 10 lahars de faible intensité ont été enregistrés, dont 2 dans la rivière du Prêcheur.

De nouveaux glissements peuvent survenir à tout moment sur la falaise Samperre. Lors de fortes pluies, ils pourront amener de nouvelles coulées de boue dans la rivière du Prêcheur. Ces événements ne sont pas liés à une activité éruptive de la Montagne Pelée mais à l'érosion de terrains volcaniques anciens à l'intérieur desquels circulent des eaux souterraines.

### Les volcans régionaux actifs

**La Soufrière de Guadeloupe :** La dernière crise volcanique remonte à 1976-1977. Le niveau de vigilance actuel est **Jaune**. Pour plus d'information, sur le bulletin de l'OVSG : <http://www.ipgp.fr/fr/ovsg/bulletins-mensuels-de-lovsg>

**La Soufrière de Montserrat :** Le volcan est en activité éruptive depuis 1995. Ce trimestre, l'activité a été faible. Le niveau d'alerte a été descendu depuis le mois d'août 2014 au **niveau 1**. L'accès à la zone du volcan est interdit ou soumis à restriction. Plus d'information sur le site du MVO : <http://www.mvo.ms/>

**Kick'em Jenny :** La dernière éruption a eu lieu en juillet 2015. Le niveau de vigilance est maintenu **Jaune**. Une zone d'exclusion de 1,5 km autour du sommet (180 m sous la surface) doit être respectée. Plus d'information sur le site du SRC : <http://www.uwiseismic.com>

## B – Activité Tellurique Régionale

L'arc insulaire des Petites Antilles résulte du plongement de la plaque Amérique sous la plaque Caraïbe. Cette subduction active a une vitesse de convergence de 2 cm/an, et provoque une déformation de la limite de ces plaques, faisant de notre archipel une région à forts aléas volcanique et sismique. Certains séismes sont directement liés aux processus de glissement entre les deux plaques. D'autres plus superficiels résultent de la déformation de la plaque Caraïbe. D'autres encore résultent de la rupture de la plaque océanique plongeant sous la Caraïbe. Durant la période historique, plusieurs séismes ont causé des dégâts / victimes en Martinique (intensités supérieures ou égales à VII) : 1827, 1839, 1843, 1906, 1946, 1953, 1999 et 2007.

Au cours du second trimestre 2016, quatre séismes de magnitude 4,0 à 5,8 au large de la Martinique, de la Guadeloupe et de Sainte-Lucie ont été ressentis (intensité II à III) en Martinique. L'activité sismique dans la zone du séisme de nord Martinique de 2007 et celle du séisme des Saintes de 2004 se poursuivent.

Les séismes ne sont pas prévisibles et peuvent survenir à n'importe quel moment en Martinique. Les actions de prévention du risque restent de rigueur : respect des réglementations parasismiques en vigueur, aménagement intérieur des lieux de vie, apprentissage du comportement à tenir avant, pendant et après un séisme.

### Sismicité régionale

L'Observatoire a localisé au cours du trimestre un total de **242** séismes régionaux d'origine tectonique, dont 216 entrent dans le cadre de la Figure 1, les autres étant plus lointains.


Quatre séismes ont été ressentis en Martinique (**intensité II à III**) : le 20 avril 2016 à 6h51 locales, localisé à 498 km à l'est-sud-est du Vauclin (M=5,8, prof=15km), le 9 mai 2016 à 9h36 locales, localisé à 149 km au nord-nord-est de Macouba (M=4,8, prof=23km), le 30 mai 2016 à 14h55 locales, localisé à 80 km à l'est-sud-est de Sainte-Anne (M=4,1, prof=11km), et le 20 juin 2016 à 17h57 locales, localisé à 62 km à l'est-nord-est du Vauclin (M=4,0, prof=34km).

Ce trimestre, **2** séismes ont été localisés dans la zone de **répliques** du séisme de magnitude 6.7 du **Nord Est de la**

**Barbade** du 16 juillet 2015, et **1** séisme s'est produit dans la zone des répliques du séisme de **Nord Martinique** du 29 novembre 2007.

L'activité sismique dans la zone de **répliques** du séisme des **Saintes du 21 décembre 2004**, entre les Saintes et la Dominique se maintient. Pour plus d'information, voir le bilan de la sismicité de l'OVSG

(<http://www.ipgp.fr/fr/ovsg/bulletins-mensuels-de-lovsg>)



**Figure 1.** Carte des épicentres (partie supérieure de la figure) et représentation verticale suivant le profil A-B des mois d'avril, mai et juin 2016 correspondant aux séismes enregistrés et localisés par l'OVSM-IPGP. Pour chaque séisme, la couleur correspond à la profondeur et le diamètre est proportionnel à la magnitude calculée par l'OVSM-IPGP. Traits noirs = failles principales connues (d'après Feuillet et al. 2000).

La Direction de l'OVSM-IPGP, le 18 juillet 2016

# Bilan trimestriel de l'activité volcanique de la Montagne Pelée et de la sismicité régionale de la Martinique

No. 2016-2 – Avril, mai et juin 2016



Observatoire volcanologique  
et sismologique  
de Martinique  
INSTITUT DE PHYSIQUE DU GLOBE DE PARIS



Collectivité  
Territoriale  
de Martinique

ISSN 2105-  
2301

page 3 sur 3

## C – Annexes

### Définition des niveaux d'activité volcanique pour la Montagne Pelée

Activité globale observée	Minimale niveau de base	En augmentation variations de quelques paramètres	Fortement augmentée variations de nombreux paramètres, sismicité fréquemment ressentie	Maximale sismicité volcanique intense, déformations majeures, explosions
Délais possibles	Siècle(s) / Années	Année(s) / Mois	Mois / Semaines	Imminente / En cours
<i>Décision</i> ← OVS-M-IPGP → ← Préfecture →				
Niveaux d'alerte	<b>VERT = Pas d'alerte</b>	<b>JAUNE = Vigilance</b>	<b>ORANGE = Pré alerte</b>	<b>ROUGE = Alerte</b>

### Définition simplifiée de l'échelle des intensités macrosismiques

Intensités	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X+
Perception Humaine	Non ressenti	Très faible	Faible	Légère	Modérée	Forte	Très forte	Sévère	Violente	Extrême
Dégâts probables	aucun				Très légers	Légers	Modérés	Moyens	Importants	Généralisés

### Appel à témoignages sur les séismes ressentis

Vos témoignages nous intéressent et permettront aux ingénieurs et sismologues de mieux tenir compte des spécificités locales dans la mitigation du risque sismique en Martinique. Les intensités réelles (sévérité de la secousse au sol en un lieu donné qui est déduite des effets d'un séisme) ne peuvent être correctement déterminées que par recueil de témoignages. Si vous avez ressenti un séisme, même faiblement, vous êtes invité à le signaler à l'observatoire et/ou à prendre quelques minutes pour remplir le formulaire d'enquête macrosismique du BCSF sur le site <http://www.franceseisme.fr/>.

**Merci aux organismes, collectivités et associations d'afficher publiquement ce bilan pour une diffusion la plus large possible. Pour le recevoir par e-mail, faites simplement la demande à <[infos@ovsm.martinique.univ-ag.fr](mailto:infos@ovsm.martinique.univ-ag.fr)>. Les précédents bilans et communiqués sont en ligne sur le site <http://www.ipgp.fr/fr/ovsm/bilans-trimestriels-de-lovsm>.**

**Les informations de ce document ne peuvent être utilisées sans y faire explicitement référence.**